

## **TERMINOLOGIA DELLE LESIONI INTRAEPITELIALI SQUAMOSE DELLA VULVA (ISSVD 2015)**

Le lesioni intraepiteliali squamose della vulva comprendono tre tipi di lesioni:

- LSIL della vulva (LSIL vulvare, condiloma piatto, o effetto da HPV).
- HSIL della vulva (HSIL vulvare, VIN usuale).
- DVIN.

SIL è acronimo di Squamous Intraepithelial Lesion (Lesione Intraepiteliale Squamosa). LSIL indica Low-grade SIL (SIL di basso grado). HSIL indica High-grade SIL (SIL di alto grado). VIN indica Vulvar Intraepithelial Neoplasia (Neoplasia Intraepiteliale Vulvare). DVIN indica Differentiated-type VIN (VIN differenziata).

LSIL e HSIL sono lesioni squamose intraepiteliali associate all'HPV, in accordo alla terminologia LAST (Lower Anogenital Squamous Terminology) introdotta nel 2012 dall'American Society for Colposcopy and Cervical Pathology (ASCCP) e dal College of American Pathologists. DVIN è una lesione intraepiteliale squamosa associata al lichen sclerosus e al lichen planus.

LSIL non è una lesione precancerosa. HSIL è la lesione preinvasiva del carcinoma squamoso basaloide e condilomatoso. DVIN è la lesione preinvasiva del carcinoma squamoso cheratinizzante.